

花柳病治療學

(三十三)

(葉勤秋編)

生于龜頭溝者。形長圓。往往數顆集合。占居全溝。生于龜頭者。大如小豆。或如豌豆。形圓。或腰圓。有生于包皮內面者。多數相合。呈種種之形狀。其時腫脹極甚。生於繫帶者。(龜頭下面之繫帶)不惟破壞繫帶。即陰莖下面。亦成巨大之潰瘍。若侵入深層。必致大出血。生於尿道口者。易蔓延尿道粘膜炎。膿水流。膠粘尿道口唇。潮時發痛。包莖之狀。下疳。多在包皮內面。繫帶處。龜頭等處。包皮不能翻轉。故不能目擊潰瘍。試觸包皮外面。常潰瘍處。生於肛門者。潰瘍之破裂。膿液。或則呈大豆之大潰瘍。便時發劇痛。惟罹者不多。

病者或急于醫治。或怠于清潔。或懶于戒煙。致助炎症之滋長。起患部之腫脹。寔成延之痼症。遷延時日。有名食性下疳者。其潰瘍延及周圍。內蝕深部。自數月至年餘。蔓延不已。自陰部而陰囊。陰囊。腹股。往往誤認爲第三期梅毒之皮膚潰瘍。蓋兩症外觀極似。實難于鑑別也。治法當用強烈之腐蝕藥。使失其固有之性。變爲尋常之潰瘍面。繼即換海與仿等。

證保實切有用信求務版出 報識常學醫會社名又 格人及驗經識學有者持主

本館代售各種靈驗藥品

丹方一味。氣味名醫。我中醫治病之奇效。殊出人意料之外。每有數年沉痾。見效一旦。誠藥之靈驗。本館有鑒于此。是以有代售各地靈藥之舉。凡各埠之讀者。如有的確靈驗之方。而曾經試驗有效者。製爲藥丸。本館願代爲推銷。大開病家方便之門。謀進人羣幸福之途。此本館發起斯舉之微旨也。

最新白濁丸 咳嗽粉

最新白濁丸
主治：專治一切新久咳嗽神效無比。服法：每袋分三次服。每日食後開水調服。或加冰糖少許尤佳。
價目：每袋大洋三角。每打大洋三元。
代售處：上海幸福報館。上海張少波監製。

咳嗽粉
主治：專治一切新久咳嗽神效無比。服法：每袋分三次服。每日食後開水調服。或加冰糖少許尤佳。
價目：每袋大洋三角。每打大洋三元。
代售處：上海幸福報館。上海張少波監製。

筆主報本

楊志一 士醫
朱振聲 士醫

診例
(甲)特號二元 隨到隨診
(乙)門診一元 貧病減半
(丙)出診四元 路途遙加
(丁)膏丸方四元 次日取件
(戊)急病隨請隨到

本報特聘 律師 醫師 會計 顧問

本報特聘 律師 醫師 會計 顧問

本報特聘 律師 醫師 會計 顧問

刊日三福幸

本報特聘 律師 醫師 會計 顧問

本報特聘 律師 醫師 會計 顧問

本報特聘 律師 醫師 會計 顧問

本報特聘 律師 醫師 會計 顧問

本報特聘 律師 醫師 會計 顧問

本報特聘 律師 醫師 會計 顧問

本報特聘 律師 醫師 會計 顧問

本報特聘 律師 醫師 會計 顧問

性的衛生 (六十二) (主稿)

二十八折半是十四，十四再加七歲是二十一歲，則可知二十一歲的女子，是她的未婚妻最適當的年齡。現在把他列一個表格在下面：

男性的年齡	女性的年齡
二十四歲到二十五歲	十九歲
二十六歲到二十七歲	二十一歲
二十八歲到二十九歲	二十三歲
三十歲到三十一歲	二十五歲
三十二歲到三十三歲	二十七歲
三十四歲到三十五歲	二十九歲
三十六歲到三十七歲	三十一歲
三十八歲到三十九歲	三十三歲
四十歲	三十五歲

以上諸事，晚婚是怎樣呢？晚婚的標準，又是怎樣呢？我說男子到了三十歲還沒有娶妻，女子到了二十五歲還沒有嫁人，我們就可稱他是晚婚了。——但因體質之不同，上下一二歲，也沒有關係。——晚婚的情形，又是怎樣呢？關於這一層，可以簡單的把他分做幾項說：(甲)因為身體過於衰弱，或有肺病等慢性病在身。結婚之後，身體勢必更加衰弱，病必更加利害，那麼，到身體養好了之後，再結婚不遲。這種情形的晚婚，對於生理上非特沒有妨害，且有利益。(未完)

小藥囊

稿投迎歡

家庭醫藥常識 (五)

治初產陰戶腫痛方 (陳運卿)
紅骨草、煎湯洗之。
治乳少驗方 (前人)
當歸五兩、川芎三兩、生芪四兩、蒲公英二兩、白芷二兩、活羅二兩、通草三兩、豬蹄四個、水二盤、煎一盤、服。
治疥瘡方 (前人)
二陳湯 半夏、陳皮、茯苓、生薑、甘草、生薑夏陳化痰理氣。茯苓甘草滲濕調中。分治中焦一切痰飲之主力。
小半夏茯苓湯 半夏、生薑、茯苓、水飲凝結胸間。陽氣不能宣達。嘔吐、心下痞。口不渴目眩心悸者。此方主之。半夏生薑。辛溫之性。辛以散寒。溫以通陽。加茯苓以利水。氣化津行。飲從小便而出。宜其

婦女病

治經閉不通方 (前人)
四逆散四兩、浙貝四兩、銀花四兩、生芪四兩、白芍四兩、全蝎九隻、山甲四兩、當歸四兩、甘草三兩、清水三盤、煎碗半。
戒鴉片烟方 (前人)
蘭羊花一兩、當歸三兩、熟地三兩、黨參二兩、焦朮一兩、烟清一兩半、浸酒一星期、萬桃花一兩、路車利葉一兩、欽力藥一兩、舊茶末一兩、共研末、和麩草捲烟吸之。
治便毒瘰癧橫痃方 (前人)
四逆散四兩、浙貝四兩、銀花四兩、生芪四兩、白芍四兩、全蝎九隻、山甲四兩、當歸四兩、甘草三兩、清水三盤、煎碗半。

第二章 痰飲自療法

(一) 濕痰自療法

病因 濕痰皆屬脾。其因有三。一因脾虛生濕。精濕生痰。一因濕邪傷脾。脾陽不運。濕停為痰。一因酒濕痰。痰。脈緩而黃。肢體沉重。腹脹嗜臥。納穀不香。其痰多而易于咯出。
傳變 脾主肌肉。濕痰流注肌肉。必變癰核。脾主四肢。濕痰流入骨節。臂痛難舉。(未完)

肺炎病治法

(中)

(章太炎)

形體如煙者。身無精華。是血絕不榮於身也。心脈既絕。目赤視者。心經絕也。頭暈諸痛之會。搖頭者陰陽而無根也。(以上成說)然則此症之麻黃必不可用。要略咳嗽云。以其人遠痺。故不用麻黃。若逆而內之者必厥。所以然者。以其人血虛。麻黃發其陽故也。至以寒藥阻遏脈道。其戒更不言而喻矣。(予見西醫治此。有用強心劑。服時喘止。其熱漸退而者。初疑其偶然